



Внимание! Корь!

Корь передаётся воздушно-капельным путем и очень заразна!

Практически все не привитые и не переболевшие лица любого возраста при контакте с больным корью заболевают.

Возбудитель кори, вирус, потоками воздуха с каплями слюны может переноситься на значительные расстояния.

Источники инфекции –

больной человек, в том числе до начала проявлений инфекции. Вирус выделяется уже за 5 дня до появления сыпи.

**Сохраняется риск завоза и распространения кори
в связи с активными миграционными потоками**

Симптомы:

высокая температура (38-40°C), насморк, покраснение глаз и появление крошечных белых пятен на слизистой рта. Через несколько дней сыпь появляется на лице и верхней части шеи, постепенно спускается вниз.

Осложнения:

слепота, энцефалит, тяжелая диарея, отиты, необратимая глухота, круп, пневмония или даже смерть. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до 5 лет или у взрослых людей старше 30 лет.

Профилактика:



**Единственный надёжный способ
защиты о кори - вакцинация.
Детям вакцинация проводится в 12
месяцев, ревакцинация – в 6 лет.
Взрослым, не болевшим корью или
не имеющим сведений о прививках,
также рекомендуется прививаться
дважды.**